



Idrosoyl

15-05-30 +2MgO

NPK 15-05-30 +2MgO arricchito
con microelementi

Idrosoyl 15-05-30 + 2MgO + Micro è un concime idrosolubile ad altissima solubilità e purezza, esente da sodio, cloruri e carbonati e ad alto titolo di azoto e potassio. La presenza di magnesio e di microelementi favorisce lo sviluppo della pianta. **Idrosoyl 15-05-30 + 2MgO + Micro** è ideale per uno sviluppo equilibrato nella fase che va dall'allegagione all'accrescimento dei frutti migliorando la fase di maturazione e incrementando il grado brix. **Idrosoyl 15-05-30 + 2MgO + Micro** comporta massima assimilabilità dei nutrienti, massima resistenza naturale delle colture, ispessimento dei tessuti e incremento della sostanza secca, efficace nutrizione azotata ed eliminazione dei rischi di bruciature o locali disseccamenti.

BENEFIT DI IDROSOYL 15-05-30 +2MgO

- | **ISPESSISCE I TESSUTI**
- | **AUMENTA IL GRADO BRIX**
- | **MIGLIORA LA FASE DI MATURAZIONE**



INGREDIENTI:
 Azoto ammoniacale + Ossido di potassio
 + Azoto nitrico + Ossido di magnesio
 + Azoto ureico + Microelementi EDTA
 + Anidride fosforica



FORMATO IN KG:
 1-5-10-25



USO FOGLIARE



USO RADICALE

COMPOSIZIONE (espressa in %)

Azoto totale 15%	Azoto ammoniacale 1%	Azoto nitrico 1%
Azoto ureico 13%	Anidride fosforica 5%	Anidride fosforica solubile 5%
Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro 5%	Ossido di potassio totale 30%	Ossido di potassio idrosolubile 30%
Ossido di magnesio totale 2%	Ossido di magnesio idrosolubile 2%	Ferro chelato EDTA 0,02%
Manganese chelato EDTA 0,01%	Zinco chelato EDTA 0,002%	Rame chelato EDTA 0,002%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Epoche d'impiego	Dose fogliare gr/q.le	Dose radicale Kg/ha
Pomacee (es. melo, pero)	Durante tutto il ciclo e nella fase di maturazione dei frutti	250-300	25-40
Drupacee (es. olivo, pesco)	Durante tutto il ciclo e nella fase di maturazione dei frutti	200-300	25-40
Orticole (protette e pieno campo)	Durante tutto il ciclo e nella fase di maturazione dei frutti	200-300	25-40
Industriali (es. pomodoro, patata)	Durante tutto il ciclo e nella fase di maturazione dei frutti	200-300	25-40
Vite (da vino e da tavola)	Durante tutto il ciclo e nella fase di maturazione dei frutti	250-400	25-40
Ornamentali, vivai	Durante tutto il ciclo	150-200	25-40

Applicazioni: Il prodotto può essere applicato in ogni stadio fenologico rispettando le dosi prescritte. In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Non ha tempi di carenza e non lascia residui. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.