

Natural® Solution

NPK

Idrosoyl 18-18-18 + Micro

NPK 18-18-18 arricchito con microelementi

COMPOSIZIONE (espressa in %)

18%	Azoto totale
5%	Azoto ammoniacale
1%	Azoto nitrico
12%	Azoto ureico
18%	Anidride fosforica
18%	Anidride fosforica solubile
18%	Ossido di potassio totale
18%	Ossido di potassio idrosolubile
0,02%	Ferro chelato EDTA
0,01%	Manganese chelato EDTA
0,002%	Zinco chelato EDTA
0,002%	Rame chelato EDTA

DESCRIZIONE

Idrosoyl 18-18-18 + Micro è un concime idrosolubile che può essere utilizzato in tutte le fasi fenologiche ed ha lo scopo di produrre uno sviluppo equilibrato della pianta in condizioni di stress abiotico, per uso fogliare ed in fertirrigazione, con aggiunta di microelementi. **Idrosoyl 18-18-18 + Micro** garantisce l'ottenimento di piante con un ottimo equilibrio vegeto-produttivo favorendo una buona fioritura e produzione finale. **Idrosoyl 18-18-18 + Micro** è arricchito con microelementi per garantire alla pianta il normale svolgimento delle principali funzioni biologiche quali la fotosintesi clorofilliana e lo sviluppo meristematico. **Idrosoyl 18-18-18 + Micro** svolge una forte azione stimolante verso lo sviluppo radicale e vegetativo e rafforza le difese immunitarie migliorando la capacità di superare stress di vario genere e correggere i difetti legati all'eccessiva conducibilità dell'acqua utilizzata dovuta da eccessi di sali disciolti o da elevata alcalinità.

BENEFIT

- Aumenta la fioritura
- Migliora l'attività fotosintetica
- Sviluppo equilibrato della pianta

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	FOGLIARE	RADICALE
Pomacee (es. melo, pero)	Durante tutto il ciclo, nella fase di fioritura ed ingrossamento frutto	250-300 g/hl	25-40 Kg/ha
Drupacee (es. olivo, pesco)	Durante tutto il ciclo, nella fase di fioritura ed ingrossamento frutto	200-300 g/hl	25-40 Kg/ha
Orticole (protette e pieno campo)	Durante tutto il ciclo, nella fase di fioritura ed ingrossamento frutto	200-300 g/hl	25-40 Kg/ha
Industriali (es. pomodoro, patata)	Durante tutto il ciclo, nella fase di fioritura ed ingrossamento frutto	200-300 g/hl	25-40 Kg/ha
Vite (da vino e da tavola)	Durante tutto il ciclo, nella fase di fioritura ed ingrossamento acino	250-400 g/hl	25-40 Kg/ha
Ornamentali, vivai	Durante tutto il ciclo	150-200 g/hl	25-40 Kg/ha

Ingredienti: Azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, anidride fosforica, ossido di potassio, microelementi EDTA
Applicazioni: Il prodotto può essere applicato in ogni stadio fenologico rispettando le dosi prescritte. In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Non ha tempi di carenza e non lascia residui. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.
Packaging: 25kg
Parametri: pH sol.6% 3,95 ; EC sol.10% 57,50 dS/m